

- Commission belge de coordination de la politique antibiotique («Belgian Antibiotic Policy Coordination Committee»):
 - Recommandation sur la cystite aiguë chez la femme (novembre 2001) via www.health.fgov.be/antibiotics/fr/cystiterec.pdf
 - Recommandation sur le traitement antibiotique de la pyélonéphrite aiguë acquise dans la communauté chez l'adulte immunocompétent admis en hospitalisation (août 2002) via www.health.fgov.be/antibiotics/fr/pyelonephriterec.pdf
- *Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Huisartsen* (WVVH): recommandation de bonne pratique sur la cystite chez la femme (2000) via www.wvvh.be/files/cystitis_ab.pdf
- Hooton TM: The current management strategies for community-acquired urinary tract infection. *Infect Dis Clin N Am* 2003; 17: 303-32
- Fihn S: Acute uncomplicated urinary tract infection in women. *New Engl J Med* 2003; 349: 259-66
- Cystite aiguë simple de la femme jeune. Un diagnostic par les plaintes spontanées. *La Revue Prescrire* 2003; 23: 532-34
- Vogel T, Verreault R, Gourdeau M, Morin M, Grenier-Gosselin L, Rochette L: Optimal duration of antibiotic therapy for uncomplicated urinary tract infection in older women: a double-blind randomized controlled trial. *Can Med Ass J* 2004;170: 469-473
- Jepson RG, Mihaljevic L, Craig J: Cranberries for preventing urinary tract infections (Cochrane Review). The Cochrane Library Issue 1, 2005
- Fiches modèles OMS d'information à l'usage des prescripteurs: Médicaments utilisés dans les infections bactériennes (2003)

EN BREF

➤ **Quelle est la place des médicaments dans le traitement et la prévention des maladies parodontales?** Les maladies parodontales regroupent les gingivites (inflammation réversible des gencives) et les parodontites (destruction irréversible du parodonte). La plaque dentaire et les germes qui la composent jouent un rôle déterminant dans l'apparition des maladies parodontales. Le tabagisme, un diabète mal équilibré et une immunodéficiência sont aussi des facteurs de risque importants. La prise en charge des maladies parodontales consiste en premier lieu à lutter contre la plaque dentaire par le brossage des dents (au moins une fois par jour), le nettoyage des espaces interdentaires et un détartrage régulier. Il n'est pas prouvé que l'incorporation de certaines substances à des bains de bouche ou des dentifrices apporte un avantage supplémentaire au brossage régulier des dents. La chlorhexidine peut toutefois être utile dans certains cas, par ex. en cas de brossage difficile ou impossible, mais elle est susceptible de colorer les dents et d'altérer la perception du goût. L'administration d'antibiotiques par voie locale ou générale ne se justifie pas en routine, sauf en prévention de l'endocardite bactérienne lors de certaines interventions [voir Folia de mars 2000]. [*La Revue Prescrire* 2003;23:841-45]

ERRATA

Dans les Folia de mai 2005, page 44, une erreur est à signaler dans la référence de l'article du *Drug and Therapeutics Bulletin*. La référence correcte est 2005;43:1-6.