

L.M.H.Wing et al.: A comparison of outcomes with angiotensin-converting-enzyme inhibitors and diuretics for hypertension in the elderly. *New Engl. J. Med.* **348**, 583-592 (2003)
E.D.F. Frohlich (Editorial): Treating hypertension – What are we to believe? *New Engl. J. Med.* **348**, 639-641 (2003)
P. August: Initial treatment of hypertension. *New Engl. J. Med.* **348**, 610-617 (2003)
Het *National Heart, Lung, and Blood Institute* geeft op de website <http://www.nhlbi.nih.gov/health/allhat/index.htm> informatie over de ALLHAT-studie, met o.a. ook links naar een “Allhat Study Web Site” (deze laatste is direct te consulteren via <http://www.allhat.sph.uth.tmc.edu>).

Glossarium

Primaire en secundaire eindpunten:

Een **primaire** eindpunt is een uitkomst die men meet om de primaire onderzoeksvraag te beantwoorden, en die a priori de basis vormt voor de statistische berekeningen (met inbegrip van het berekenen van het aantal patiënten dat in de studie moet worden opgenomen) beschreven in het studieprotocol. Een **secundair** eindpunt is een uitkomst die eveneens kan gemeten worden bij de analyse van een klinische studie, maar die deze statistische berekeningen niet beïnvloedt.

Medegedeeld door het Centrum voor Geneesmiddelenbewaking

MISBRUIK VAN FLUNITRAZEPAM

In de Folia van februari 1996 werd reeds gewezen op het misbruik van flunitrazepam per os (Flunitrazepam EG, Rohypnol) bij heroïnomanen, ook in België. De Belgische autoriteiten hebben meerdere maatregelen genomen om te trachten dit misbruik te beperken: plaatsen van flunitrazepam op de lijst van speciaal gereguleerde psychotrope middelen, terugtrekken van de markt van de specialiteiten die meer dan 1 mg flunitrazepam per eenheid bevatten, en, meer recent, reductie van de verpakkingsgrootte (max. 10 comprimés). In december 2001 werd door de Farmaceutische Inspectie (nu Directoraat-generaal Bescherming Volksgezondheid: Geneesmiddelen) een enquête uitgevoerd in alle officina-apotheken in de provincie Luik, waarbij de gegevens inzake aflevering van flunitrazepam in die maand, werden gebruikt. Daaruit blijkt dat in december 2001 gemiddeld 47 comprimés (minimum 10, maximum 390 comprimés) per patiënt werden afgeleverd (in totaal 2.409 patiënten), en dat in de meeste gevallen op eenzelfde voorschrift meer dan één verpakking van 10 comprimés was vermeld. Eveneens in december 2001 werden aan toxicomanen die een methadonkuur volgden of andere toxicomanen gekend door de apotheker (in totaal 261 patiënten) gemiddeld 122 comprimés (minimum 10, maximum 930 comprimés) afgeleverd. Waarschijnlijk heeft een aantal van deze patiënten niet zelf al de hen afgeleverde comprimés ingenomen. De resultaten van deze enquête suggereren dat er nog steeds problemen van misbruik zijn met flunitrazepam.